

Institut royal des Sciences  
naturelles de Belgique

Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen

BULLETIN

MEDEDELINGEN

Tome XXVI, n° 57.  
Bruxelles, décembre 1950.

Deel XXVI, n° 57.  
Brussel, December 1950.

---

LISTE DES SUCTORIA (APHANIPTERA)

RÉCOLTES EN BELGIQUE,

par Jean COOREMAN (Bruxelles).

---

Aucune liste faunistique des *Suctoria* de notre pays n'a été publiée depuis 1900 (1). Nous croyons utile de donner la liste des espèces constituant à ce jour les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles. Elles furent recueillies au cours de ces dernières années. La répartition de ces parasites étant celle des hôtes qu'ils fréquentent, il est évident que la liste des localités mentionnées ne doit pas être entendue au sens restrictif.

*PULICIDÆ.*

*Pulex irritans irritans* LINNÉ, 1758

Hôte : *Homo sapiens* LINNÉ.

Localités : Diverses.

Distribution : Cosmopolite.

*Ctenocephalides canis* (CURTIS, 1826).

Hôtes : *Canis familiaris* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Vulpes vulpes crucigera* (BECHSTEIN).

Localités : Bruxelles, Liège, Anvers, Edegem, Watermael-Boitsfort.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEERE : = *serraticeps* GERVAIS, non *canis* DUGÈS.)

(1) LAMEERE, A., 1900, *Manuel de la Faune de Belgique*. Tome II. (Bruxelles.)

**Ctenocephalides felis felis** (BOUCHÉ, 1835).

Hôtes : *Felis domestica* (LINNÉ) ; *Canis familiaris* LINNÉ ;  
*Capreolus capreolus capreolus* (LINNÉ).

Localités : Bruxelles, Watermael - Boitsfort, Edegem,  
 Recht.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEERE : = *canis* DUGÈS.)

**Archæopsylla erinacei erinacei** (BOUCHÉ, 1835).

Hôtes : *Erinaceus europæus europæus* LINNÉ ; *Canis familiaris* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ.

Localités : Watermael, Liège, Namur, Edegem, Deurne,  
 Wijnegem.

Distribution : Europe.

**Spilopsyllus cuniculi** (DALE, 1878).

Hôte : *Oryctolagus cuniculus* (LINNÉ) ; *Lepus europæus europæus* PALLAS.

Localités : Wavreille, Bure, Stockai (Hautes Fagnes).

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Irlande,  
 Italie, Pays-Bas, Suisse.

(LAMEERE : = *goniocephalus* TASCHENBERG.)

## VERMIPSYLLIDÆ.

**Chætopsylla trichosa** KOHAUT, 1903.

Hôte : *Meles meles meles* LINNÉ.

Localité : Eelen.

Distribution : Europe.

(LAMEERE : confusion probable avec *globiceps* TASCHENBERG.)

## ISCHNOPSYLLIDÆ.

**Ischnopsyllus hexactenus hexactenus** (KOLENATI, 1857).

Hôtes : *Barbastella* sp. ; *Plecotus auritus* (LINNÉ) ; *Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis mystacinus* (KUHLE).

Localités : Beauregard (grotte de Monceau), Denée-Maredsous (Carrière souterraine), Liège (grotte du Bay-Bonnet), Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael), Maastricht.

Distribution : Allemagne, Belgique, Danemark, France,  
 Pays-Bas, Suède, Suisse, Yougoslavie, U. R. S. S.

**Ischnopsyllus intermedius** (ROTHSCHILD, 1898).

Hôtes : *Myotis dasycneme* (BOIE) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis daubentoni* (KUHL) ; *Myotis mystacinus* (KUHL).

Localités : Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael) ; Engihoul (grande caverne), Maastricht.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Suisse.

(LAMEERE : = probablement, partim *octactenus* KOLENATI.)

**Ischnopsyllus simplex simplex** ROTHSCCHILD, 1906.

Hôtes : *Plecotus auritus* LINNÉ ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis daubentoni* (KUHL) ; *Myotis mystacinus* (KUHL).

Localité : Vechmael-lez-Oreye (grotte d'Henisdael).

Distribution : Europe occidentale.

**Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata**

(TASCHENBERG, 1880).

Hôtes : *Rhinolophus ferrum - equinum ferrum - equinum* (SCHREBER) ; *Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN) ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN).

Localités : Engihoul (grande caverne), Beauregard (grotte de Monceau), Goyet, Maastricht.

Distribution : Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie.

**Nycteridopsylla pentactena** (KOLENATI, 1857).

Hôtes : *Plecotus auritus* LINNÉ ; *Myotis myotis* (BORKHAUSEN) ; *Myotis* sp.

Localités : Tailfer (grotte Alexandre), Beauregard (grotte de Monceau), Engihoul (grande caverne).

Distribution : Allemagne, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

**HYSTRICHOPSYLLIDÆ.**

**Hystrichopsylla talpæ** (CURTIS, 1826).

Hôtes : *Talpa europæa* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Microtus arvalis arvalis* (PALLAS) ; *Microtus* sp. ; *Crice-  
tus cricetus* LINNÉ ; *Micromys minutus soricinus* (HERMANN).



Localités : Boitsfort-Bruxelles, Ohain, Groenendael, Woluwe-St-Lambert, Eppegem, Esschen, Lasne, Oud-Turnhout, Walem, Velaines, Nismes.

Distribution : Europe occidentale.

### *Typhloceras poppei* WAGNER, 1903.

Hôte : recueilli dans un trou sur le sol (probablement : *Apodemus sylvaticus* LINNÉ).

Localité : Andrimont-lez-Verviers (trou des Sottais). (Rec. R. LERUTH.)

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays Bas, Suisse, Yougoslavie, Nord de l'Afrique.

### *Palæopsylla minor* (DALE, 1878).

Hôte : *Talpa europæa* L.

Localités : Bruxelles, Basse-Wavre, Eppegem, Esschen, Hockai, Oud-Turnhout, Torgny, Nismes, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse.

(LAMEERE : = *gracilis* TASCHENBERG.)

### *Palæopsylla sorecis sorecis* (DALE, 1878).

Hôte : *Sorex araneus araneus* LINNÉ.

Localité : Boitsfort-Bruxelles.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

### *Leptopsylla segnis* (SCHÖNHERR, 1816).

Hôte : *Mus musculus musculus* LINNÉ.

Localité : Bruxelles.

Distribution : Europe, Asie, Amérique.

(LAMEERE : = *musculi* DUGÈS.)

### *Ctenophthalmus agyrtes* (HELLER, 1896).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* (LINNÉ) ; *Cricetus cricetus* (LINNÉ) ; *Talpa europæa* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Microtus* sp.

Localités : Boitsfort-Bruxelles, Ohain, Groenendael, Lasne, Oud-Turnhout, Vilvorde, Beauvechain, Wavreille, Esschen, Eupen, Nismes, Torgny, Bure, Hockai, Forêt de Meerdael, Louvain.

Distribution : Europe.

(LAMEERE : = *assimilis* TASCHENBERG.)

**Ctenophthalmus bisoctodentatus** (KOLENATI, 1863).

Hôtes : *Talpa europæa* L.; *Putorius putorius putorius* LINNÉ; *Cricetus cricetus* (LINNÉ); *Microtus arvalis arvalis* (PALLAS); *Evotomys glareolus glareolus* (SCHREBER); Nids endoxyles de *Picus viridis viridis* LINNÉ (fréquentés par des petits Rongeurs).

Localités : Boitsfort - Bruxelles, Wavre, Lasne, Woluwe-St-Lambert, Walem, Velaines, Beauvechain, Eelen, Es-schen, Oud-Turnhout, Meerbeek, Nismes, Torgny.

Distribution : Europe.

**Euctenophthalmus assimilis** (TASCHENBERG, 1880).

Hôte : *Talpa europæa* L.

Localités : Wavreille, Torgny.

Distribution : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse, Sibérie.

(LAMEERE : non *assimilis* TASCHENBERG, sensu LAMEERÉ.)

**Euctenophthalmus congener** (ROTHSCHILD, 1907).

Hôtes : *Talpa europæa* LINNÉ; *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Boitsfort-Bruxelles, Vilvorde, Oud-Turnhout, Nismes.

Distribution : Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie, Sibérie.

**Rectofrontia pentacanthus** (ROTHSCHILD, 1897).

Hôtes : *Talpa europæa* LINNÉ; *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Vilvorde, Oud-Turnhout.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Suisse.

**Rectofrontia isacanthus** (ROTHSCHILD, 1907).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ; *Pitymys subterraneus subterraneus* SELYS-LONGCHAMPS.

Localités : Groenendael, Anseremme.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande, Italie, Yougoslavie.

## DOLICHOPSYLLIDÆ.

*Myoxopsylla laverani* (ROTHSCHILD, 1911).Hôte : *Eliomys quercinus* (LINNÉ).

Localité : Pétigny.

Distribution : Belgique, France, Portugal, Sardaigne, Suisse, Afrique du Nord.

*Paraceras melis* (CURTIS, 1832).Hôte : *Meles meles meles* LINNÉ.

Localités : Floreffe, Eelen, Bure, Houx.

Distribution : Toute la région paléarctique.

(LAMEERE : = *melis* WALKER.)*Nosopsyllus fasciatus* (BOSC D'ANTIC, 1801).Hôtes : *Rattus norvegicus* (ERXLEBEN) ; *Mus musculus musculus* LINNÉ.

Localités : Moorsel, Watermael-Boitsfort, Edegem.

Distribution : Cosmopolite.

*Monopsyllus sciurorum sciurorum* (SCHRANK, 1803).Hôtes : *Sciurus vulgaris russus* MILLER ; *Cricetus cricetus* LINNÉ ; *Erinaceus europæus europæus* LINNÉ ; *Martes foina foina* LINNÉ ; *Putorius putorius putorius* LINNÉ ; *Eliomys quercinus* (LINNÉ) ; *Microtus* sp. ; *Rattus norvegicus* (ERXLEBEN) ; *Glis glis glis* LINNÉ ; dans des nids de *Parus major major* LINNÉ ; *Picus viridis viridis* LINNÉ ; *Colæus monedula spermologus* VIEILLOT ; *Sturnus vulgaris vulgaris* LINNÉ ; *Columba ænas ænas* LINNÉ.

Localités : Dans toute la Belgique.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, U. R. S. S., Transcaucasie, Turkestan, Madagascar.

(LAMEERE : = *sciurorum* BOUCHÉ.)*Trichopsylla penicilliger penicilliger* (GRUBE, 1852).Hôte : Dans une microcaverne endoxyle (*Ulmus campestris* LINNÉ), fréquentée par de petits Rongeurs.



Localité : Bruxelles.

Distribution : Angleterre, Autriche, Belgique, Ecosse, Finlande, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Yougoslavie, Japon, Sibérie.

### *Trichopsylla walkeri* (ROTHSCHILD, 1902).

Hôte : *Mustela nivalis nivalis* LINNÉ; probablement *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Ecosse, Finlande, France, Pays-Bas, U. R. S. S.

### *Trichopsylla turbida* (ROTHSCHILD, 1909).

Hôtes : *Apodemus sylvaticus sylvaticus* LINNÉ; *Pitymys subterraneus subterraneus* (SELYS-LONGCHAMPS); *Talpa europæa* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Vilvorde, Louvain, Lasne, Oud-Turnhout, Hockai.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France, Islande, Pays-Bas, Yougoslavie, Suisse, U.R.S.S.

### *Ceratophyllus gallinæ gallinæ* (SCHRANK, 1803).

Hôtes : *Parus major major* LINNÉ; *Picus viridis viridis* LINNÉ; *Columba ænas ænas* LINNÉ; *Delichon urbica urbica* LINNÉ; *Passer montanus montanus* LINNÉ; nids de Passereaux indéterminés; *Martes foina foina* ERXLEBEN; diverses micro-cavernes endoxyles et nid de *Lasius niger* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Ohain, Grimbergen, Celles, Ciergnon, Basse-Wavre, Eelen, Hatrival, Houx.

Distribution : Cosmopolite.

(LAMEERE : = *gallinæ* BOUCHÉ, *partim.*)

### *Ceratophyllus hirundinis* (CURTIS, 1832).

Hôte : *Delichon urbica urbica* LINNÉ.

Localités : Evreux, Nismes, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie, Suède, Suisse, Pays-Bas, U. R. S. S., Afrique du Nord.

**Ceratophyllus fringillæ** (WALKER, 1856.)

Hôtes : *Passer domesticus* LINNÉ ; *Parus major major* LINNÉ ;  
*Sturnus vulgaris vulgaris* LINNÉ.

Localités : Bruxelles, Boitsfort, Wavreille.

Distribution : Belgique, Finlande, Pays-Bas.

(LAMEERE : = *gallinæ* BOUCHÉ, *partim*.)

**Ceratophyllus vagabundus** (BOHEMAN, 1866).

Hôte : *Colæus monedula monedula* LINNÉ.

Localité : Godinne.

Distribution : Asie, Europe boréale, Alaska.

**Ceratophyllus styx** (ROTHSCHILD, 1900).

Hôte : *Riparia riparia riparia* LINNÉ.

Localités : Maransart, Waterloo.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Finlande, Pays-Bas, Suède, Suisse.

**Ceratophyllus garei garei** (ROTHSCHILD, 1902).

Hôtes : *Fringilla cælebs cælebs* LINNÉ ; *Anthus trivialis trivialis* LINNÉ ; accidentellement : nid de *Rattus rattus rattus* LINNÉ.

Localités : Wavre, Bure, Wavreille.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Caucase, Ecosse, Finlande, Pays-Bas, Alaska, Canada, Etats-Unis.

**Ceratophyllus rusticus** WAGNER, 1903.

Hôte : *Delichon urbica urbica* LINNÉ.

Localité : Nismes.

Distribution : Allemagne, Angleterre, Belgique, Finlande, Suisse, Yougoslavie.

**Dasypsyllus gallinulæ gallinulæ** (DALE, 1878).

Hôtes : *Fringilla cælebs cælebs* LINNÉ ; *Troglodytes troglodytes occidentalis* VERHEYEN.

Localités : Bruxelles, Groenendael, Wavreille.

Distribution : Angleterre, Belgique, Ecosse, Pays-Bas, Portugal, Suisse.



LISTE DES HÔTES.

MAMMIFÈRES.

*Apodemus sylvaticus sylvaticus* (LINNÉ).

*Ctenophthalmus agyrtes* (HELLER).

*Typhloceras poppei* (WAGNER).

*Euctenophthalmus congener* (ROTHSCHILD).

*Rectofrontia pentacanthus* (ROTHSCHILD).

*Rectofrontia isacanthus* (ROTHSCHILD).

*Trichopsylla walkeri* (ROTHSCHILD).

*Trichopsylla turbida* (ROTHSCHILD).

*Barbastella* sp.

*Ischnopsyllus hexactenus* (KOLENATI).

*Canis familiaris* LINNÉ.

*Ctenocephalides canis* (CURTIS).

*Ctenocephalides felis* (BOUCHÉ).

*Archavopsylla erinacei* (BOUCHÉ).

*Capreolus capreolus capreolus* (LINNÉ).

*Ctenocephalides felis* (BOUCHÉ).

*Cricetus cricetus* (LINNÉ).

*Hystrichopsylla talpa* (CURTIS).

*Ctenophthalmus agyrtes* (HELLER).

*Ctenophthalmus bisoctodentatus* (KOLENATI).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Eliomys quercinus* (LINNÉ).

*Myoxopsylla laverani* (ROTHSCHILD).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Erinaceus europæus europæus* LINNÉ.

*Archavopsylla erinacei erinacei* (BOUCHÉ).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Erotomys glareolus glareolus* (SCHREB.).

*Ctenophthalmus bisoctodentatus* (KOLENATI).

*Felis domestica* (LINNÉ).

*Ctenocephalides felis* (BOUCHÉ).

*Glis glis glis* (LINNÉ).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Homo sapiens* LINNÉ.

*Pulex irritans* LINNÉ.

*Myotis dasycneme* (BOIE).

*Ischnopsyllus intermedius* (ROTHSCHILD).

*Myotis daubentoni* (KUHLE).

*Ischnopsyllus intermedius* (ROTHSCHILD).

*Ischnopsyllus simplex* ROTHSCCHILD.

*Myotis myotis* (BORKHAUSEN).

*Ischnopsyllus hexactenus* (KOLENATI).

*Ischnopsyllus intermedius* (ROTHSCHILD).

*Ischnopsyllus simplex* ROTHSCCHILD.

*Rhinolophopsylla unipectinata* (TASCHENBERG).

*Nycteridopsylla pentactena* (KOLENATI).

*Myotis mystacinus* (KUHLE).

*Ischnopsyllus hexactenus* (KOLENATI).

*Ischnopsyllus intermedius* (ROTHSCHILD).

*Ischnopsyllus simplex* ROTHSCCHILD.

*Myotis* sp.

*Nycteridopsylla pentactena* (KOLENATI).

*Lepus europæus europæus* PALLAS.

*Spilopsyllus cuniculi* (DALE).

*Martes foina foina* (ERXLEBEN).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Ceratophyllus gallinae* (SCHRANK).

*Meles meles meles* (LINNÉ).

*Chatopsylla trichosa* KOHAUT.

*Paraceras melis* (CURTIS).

*Micromys minutus soricinus* (HERMANN).

*Hystriechopsylla talpæ* (CURTIS).

*Microtus arvalis arvalis* (PALLAS).

*Hystriechopsylla talpæ* (CURTIS).

*Ctenophthalmus bisectodentatus* (KOLENATI).

*Microtus* sp.

*Hystriechopsylla talpæ* (CURTIS).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).

*Mus musculus musculus* LINNÉ.

*Leptopsylla segnis* (SCHÖNHERR).

*Nosopsyllus fasciatus* (BOSC).

- Mustela nivalis nivalis* LINNÉ.  
*Trichopsylla walkeri* (ROTHSCHILD).  
*Oryctolagus cuniculus* (LINNÉ).  
*Spilopsyllus cuniculi* (DALE).  
*Pitymys subterraneus subterraneus* (SELYS-LONGCHAMPS).  
*Rectofrontia isacanthus* (ROTHSCHILD).  
*Trichopsylla turbida* (ROTHSCHILD).  
*Plecotus auritus* (LINNÉ).  
*Ischnopsyllus hexactenus* KOLENATI.  
*Ischnopsyllus simplex* ROTHSCCHILD.  
*Nycteridopsylla pentactena* KOLENATI.  
*Putorius putorius putorius* LINNÉ.  
*Otenocephalides canis* (CURTIS).  
*Archæopsylla erinacei* (BOUCHÉ).  
*Hystrichopsylla talpæ* (CURTIS).  
*Otenophthalmus agyrtes* (HELLER).  
*Otenophthalmus bisoctodentatus* KOLENATI.  
*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).  
*Rattus norvegicus* (ERXLEBEN).  
*Nosopsyllus fasciatus* (BOSC).  
*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).  
*Rattus rattus rattus* LINNÉ.  
*Ceratophyllus garei garei* ROTHSCCHILD.  
*Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum* (SCHREBER).  
*Rhinolophopsylla unipectinata* TASCHENBERG.  
*Rhinolophus hipposideros hipposideros* (BECHSTEIN).  
*Ischnopsyllus hexactenus* KOLENATI.  
*Rhinolophopsylla unipectinata* (TASCHENBERG).  
*Sciurus vulgaris russus* MILLER.  
*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK).  
*Sorexorex araneus* LINNÉ.  
*Palæopsylla sorccis* (DALE).  
*Talpa europæa* LINNÉ.  
*Hystrichopsylla talpæ* (CURTIS).  
*Palæopsylla minor* (DALE).  
*Otenophthalmus bisoctodentatus* (KOLENATI).  
*Euctenophthalmus assimilis* (TASCHENBERG).  
*Euctenophthalmus congener* (ROTHSCCHILD).  
*Rectofrontia pentacanthus* (ROTHSCCHILD).  
*Trichopsylla turbida* (ROTHSCCHILD).



*Vulpes vulpes crucigera* BECHSTEIN.

*Ctenocephalides canis* (CURTIS).

# OISEAUX.

*Anthus trivialis trivialis* LINNÉ.

*Ceratophyllus garei garei* ROTHSCHILD.

*Fringilla cœlebs cœlebs* LINNÉ.

*Ceratophyllus garei garei* ROTHSCHILD.

*Dasypsyllus gallinulæ gallinulæ* (DALE).

*Colæus monedula spermologus* (VIEILLOT).

*Ceratophyllus vagabundus* (BOHEMAN).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK), (nid).

*Columba ænas ænas* LINNÉ.

*Ceratophyllus gallinæ* (SCHRANK).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK), (nid).

*Delichon urbica urbica* LINNÉ.

*Ceratophyllus gallinæ* (SCHRANK).

*Ceratophyllus hirundinis* (CURTIS).

*Ceratophyllus rusticus* WAGNER.

*Parus major major* LINNÉ.

*Ceratophyllus gallinæ* (SCHRANK).

*Ceratophyllus fringillæ* (WALKER).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK), (nid).

*Passer domesticus domesticus* LINNÉ.

*Ceratophyllus fringillæ* (WALKER).

*Passer montanus montanus* (LINNÉ).

*Ceratophyllus gallinæ* (SCHRANK).

*Picus viridis viridis* LINNÉ.

*Ceratophyllus gallinæ* (SCHRANK).

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK), (nid).

*Ctenophthalmus bisectodentatus* KOLENATI, (nid).

*Riparia riparia riparia* (LINNÉ).

*Ceratophyllus styx* (ROTHSCHILD).

*Sturnus vulgaris vulgaris* LINNÉ.

*Monopsyllus sciurorum* (SCHRANK), (nid).

*Ceratophyllus fringillæ* (WALKER).

*Troglodytes troglodytes occidentalis* VERHEYEN.

*Dasypsyllus gallinulæ* (DALE).

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.

AD. GOEMAERE, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles